

# Тест RUS-AUDIT для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя

1

## Краткая инструкция по работе с тестом RUS-AUDIT:

- Медицинский работник зачитывает вопрос и варианты ответа. Респондент выбирает подходящий ему вариант ответа.
- Медицинский работник отмечает в отдельном окне бланка анкеты балл, соответствующий выбранному варианту ответа.
- После завершения прохождения теста медицинский работник подсчитывает баллы и записывает их в бланк анкеты.
- В зависимости от итоговой суммы баллов медицинский работник оказывает необходимый объем помощи.

1. Как часто Вы употребляете алкогольные напитки?							Балл			
Никогда	0	Раз в месяц или реже	1	2-4 раза в месяц	2	2-3 раза в неделю	3	4 раза в неделю и чаще	4	<input type="radio"/>

## 2. Сколько алкогольных напитков (стандартных порций) Вы употребляете в типичный день, когда выпиваете?

Интервьюер! Покажите цветную таблицу перевода объемов алкогольных напитков в стандартные порции (СП) и дождитесь ответа респондента. Одна стандартная порция содержит 10 г этилового спирта. На рисунках представлены примеры одной СП. Если в типичный день Вы употребляете несколько разных алкогольных напитков, то суммируйте число СП.

Маленький бокал вина или шампанского, 100 мл Крепость 12–13%	Половина кружки пива, 250 мл Крепость 4,5–5%	Бокал креплённого вина, 60 мл Крепость 16–22%	Маленькая рюмка крепкого алкоголя, 30 мл Крепость 40%	
				

Интервьюер! Если респондент затрудняется ответить на данный вопрос, то уточните у него, какой вид и какой объем алкогольных напитков он употребляет, и обведите соответствующее им количество СП и балл в таблице ниже.

Если в типичный день респондент употребляет разные алкогольные напитки, то обведите все объемы употребляемых алкогольных напитков, суммируйте соответствующее им число СП и отмечьте балл.

**Пример:** Пациент употребляет 200 мл водки (5–6 СП) и 500 мл пива (1–2СП), в сумме – 6–8 СП, что не попадет в предложенные интервалы, поэтому выбираем среднее значение – 7СП. Итог –3 балла.

Вино или шампанское	Пиво	Крепленое вино	Крепкий алкоголь	Балл
до 250 мл	до 650 мл	до 170 мл	до 80 мл	<input checked="" type="radio"/> 1–2 СП      0 <input type="radio"/>
251–450 мл	651–1200 мл	171–300 мл	81–140 мл	<input checked="" type="radio"/> 3–4 СП      1 <input type="radio"/>
451–660 мл	1201–1750 мл	301–430 мл	141–210 мл	<input checked="" type="radio"/> 5–6 СП      2 <input type="radio"/>
661–970 мл	1751–2500 мл	431–640 мл	211–300 мл	<input checked="" type="radio"/> 7–9 СП      3 <input type="radio"/>
более 970 мл	более 2500 мл	более 640 мл	более 300 мл	<input checked="" type="radio"/> 10 СП и больше      4 <input type="radio"/>

## 3. Как часто Вы употребляете как минимум 1,5 л пива, или как минимум 180 мл крепкого алкоголя, или как минимум бутылку вина или шампанского (750 мл) в течение 24 часов?

Никогда	0	Реже одного раза в месяц	1	Ежемесячно	2	Еженедельно	3	Ежедневно или почти ежедневно	4	<input type="radio"/>
---------	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	-------------------------------	---	-----------------------

## 4. Как часто за последние 12 месяцев Вы не могли остановиться, начав употреблять алкогольные напитки?

Никогда	0	Реже одного раза в месяц	1	Ежемесячно	2	Еженедельно	3	Ежедневно или почти ежедневно	4	<input type="radio"/>
---------	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	-------------------------------	---	-----------------------

## 5. Как часто за последние 12 месяцев из-за выпивки Вы не сделали то, что от Вас обычно ожидалось?

Никогда	0	Реже одного раза в месяц	1	Ежемесячно	2	Еженедельно	3	Ежедневно или почти ежедневно	4	<input type="radio"/>
---------	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	-------------------------------	---	-----------------------

## 6. Как часто за последние 12 месяцев Вам необходимо было выпить утром, чтобы прийти в себя после выпивки (опохмелиться)?

Никогда	0	Реже одного раза в месяц	1	Ежемесячно	2	Еженедельно	3	Ежедневно или почти ежедневно	4	<input type="radio"/>
---------	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	-------------------------------	---	-----------------------

## 7. Как часто за последние 12 месяцев Вы испытывали чувство вины или сожаления после выпивки?

Никогда	0	Реже одного раза в месяц	1	Ежемесячно	2	Еженедельно	3	Ежедневно или почти ежедневно	4	<input type="radio"/>
---------	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	-------------------------------	---	-----------------------

## 8. Как часто за последние 12 месяцев Вы были неспособны вспомнить, что было накануне, из-за того, что Вы выпивали?

Никогда	0	Реже одного раза в месяц	1	Ежемесячно	2	Еженедельно	3	Ежедневно или почти ежедневно	4	<input type="radio"/>
---------	---	--------------------------	---	------------	---	-------------	---	-------------------------------	---	-----------------------

## 9. Являлось ли Ваше употребление алкогольных напитков причиной травмы у Вас или у других людей?

Никогда	0	Да, более 12 месяцев назад	2	Да, в течение последних 12 месяцев	4	<input type="radio"/>
---------	---	----------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------

## 10. Случалось ли, что Ваш близкий человек или родственник, друг или врач беспокоился насчет употребления Вами алкоголя или советовал выпивать меньше?

Никогда	0	Да, более 12 месяцев назад	2	Да, в течение последних 12 месяцев	4	<input type="radio"/>
---------	---	----------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------

Укажите количество баллов \_\_\_\_\_

Максимальное количество баллов 40

Женщина

Мужчина

## Интерпретация результатов теста RUS-AUDIT для мужчин и женщин

Зона риска	Количество баллов		Уровень риска	Тактика медицинского работника
	Женщины	Мужчины		
Зона I	0–4	0–8	Относительно низкий риск возникновения проблем, связанных с употреблением алкоголя.	Информационные материалы о неблагоприятном влиянии алкоголя на здоровье.
Зона II	5–9	9–13	Опасное употребление алкоголя – употребление алкоголя, которое увеличивает риск возникновения вредных последствий для человека или для окружающих его людей.	Информационные материалы о неблагоприятном влиянии алкоголя на здоровье. Совет по ограничению потребления алкоголя.
Зона III	10	14–16	Пагубное употребление алкоголя – употребление алкоголя, которое приводит к последствиям для физического и психического здоровья.	Краткое вмешательство/консультирование, наблюдение в ПМСП.
Зона IV	11 и более	17 и более	Риск возможной алкогольной зависимости.	Дальнейшее обследование, возможное направление к специалисту наркологу.